



# СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ (ЗАВДАННЯ РІВНЯ СТАНДАРТУ)

Час виконання – 150 хвилин

Робота складається з 28 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–26 Ви маєте позначити в бланку **A**. Розв'язання завдань 27, 28 Ви маєте записати в бланку **B**.

Результат виконання **всіх** завдань буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для випускників, які вивчали математику на **рівні стандарту**.

## Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
2. Рисунки до завдань виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.
3. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання. Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтесь виконати всі завдання.
5. Ви можете скористатися довідковими матеріалами, наведеними на сторінках 2, 19, 20. Для зручності Ви можете їх відокремити відривавши.

## Інструкція щодо заповнення бланків відповідей **A** та **B**

1. У бланк **A** записуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань, лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **A** буде зараховано як помилкові.
3. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–20 в бланку **A** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразках:



4. Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 21–26 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведеніх місцях бланка **A**.
5. Виконавши завдання 27 та 28 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку **B**.
6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **A**, та правильного розв'язання завдань 27, 28 в бланку **B**.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка **A** так:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

Зичимо Вам успіху!

## ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

### Таблиця квадратів від 10 до 49

| Десятки | Одиниці |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 0       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1       | 100     | 121  | 144  | 169  | 196  | 225  | 256  | 289  | 324  | 361  |
| 2       | 400     | 441  | 484  | 529  | 576  | 625  | 676  | 729  | 784  | 841  |
| 3       | 900     | 961  | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
| 4       | 1600    | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |

### АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

#### Формули скороченого множення

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

#### Модуль числа

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0 \end{cases}$$

#### Степені

$$a^1 = a, a^n = \underbrace{a \cdot a \dots \cdot a}_{n \text{ разів}} \text{ для } a \in R, n \in N, n \geq 2$$

$$a^0 = 1, \text{ де } a \neq 0 \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ для } a \neq 0, n \in N$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a > 0, m \in Z, n \in N, n \geq 2$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

$$(ab)^x = a^x \cdot b^x \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

#### Квадратне рівняння

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

$$D = b^2 - 4ac \text{ — дискримінант}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \text{ якщо } D > 0$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}, \text{ якщо } D = 0$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

#### Логарифми

$$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, k \neq 0$$

$$a^{\log_a b} = b \quad \log_a a = 1 \quad \log_a 1 = 0$$

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$$

#### Арифметична прогресія

$$a_n = a_1 + d(n - 1) \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

#### Геометрична прогресія

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} \quad S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, \quad (q \neq 1)$$

#### Теорія ймовірностей

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

#### Комбінаторика


$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = n! \quad C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

**Завдання 1–4 і 5–16 мають відповідно по чотири та п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!**

**Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!**

**Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей**

1. На діаграмі відображено інформацію про кількість проданих телевізорів у супермаркеті побутової техніки протягом перших шести місяців року. Яке з наведених тверджень є правильним?




| A   | B                               | V  | Г   |
|---|---------------------------------|--|---|
| найменшу кількість телевізорів продано у квітні | у січні продано 240 телевізорів | у березні продано телевізорів більше, ніж у лютому | у червні продано менше трьохсот телевізорів |

2. Кожен із 40 учасників семінару має бути забезпечений двома однаковими пляшками води. Укажіть **найменшу** кількість упаковок, кожна з яких містить 12 пляшок води, яких вистачить для всіх учасників семінару.

| A | B | V | Г |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 3 |

3. На рисунку зображено пряму трикутну призму. Її бічною гранню є


- А трикутник
- Б паралелограм, що не є прямокутником
- В відрізок
- Г прямокутник



4. Розв'яжіть рівняння  $x^2 - 8x + 15 = 0$ .


| A    | Б      | В     | Г     |
|------|--------|-------|-------|
| 3; 5 | -3; -5 | -3; 5 | 3; -5 |

5. На рисунку зображено паралелограм  $ABCD$ , точка  $B$  лежить на прямій  $MC$ . Визначте градусну міру кута  $CDA$ , якщо  $\angle MBA = 25^\circ$ .



| А           | Б          | В           | Г           | Д           |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| $115^\circ$ | $65^\circ$ | $175^\circ$ | $165^\circ$ | $155^\circ$ |

6. На рисунку зображеного графік функції  $y = f(x)$ , визначеної на проміжку  $[-1; 4]$ . Укажіть поміж наведених координати точки, що належить цьому графіку.



| A      | Б      | В       | Г       | Д       |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| (2; 0) | (0; 1) | (-2; 2) | (4; -2) | (-2; 4) |

7.  $(\sqrt{2} - a)(\sqrt{2} + a) =$

| A       | Б         | В                | Г              | Д                   |
|---------|-----------|------------------|----------------|---------------------|
| $2 - a$ | $2 - a^2$ | $\sqrt{2} - a^2$ | $2 - \sqrt{a}$ | $\sqrt[4]{2 - a^2}$ |

8. Значення температури  $F$  за шкалою Фаренгейта пов'язане зі значенням температури  $C$  за шкалою Цельсія співвідношенням  $F = 1,8 \cdot C + 32$ . Скільки градусів показуватиме термометр зі шкалою Фаренгейта, якщо за таких самих умов термометр зі шкалою Цельсія показуватиме  $50^{\circ}\text{C}$ ?

| A                     | Б                     | В                    | Г                    | Д                     |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| $-10^{\circ}\text{F}$ | $122^{\circ}\text{F}$ | $10^{\circ}\text{F}$ | $41^{\circ}\text{F}$ | $932^{\circ}\text{F}$ |

9. Спростіть вираз  $\frac{(2x^2)^3}{4x^9}$ .

| A               | Б               | В               | Г                | Д              |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| $\frac{2}{x^3}$ | $\frac{2}{x^4}$ | $\frac{4}{x^3}$ | $\frac{3}{2x^4}$ | $\frac{1}{2x}$ |

10. Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Протилежні сторони будь-якого паралелограма рівні.
- II. Довжина сторони будь-якого трикутника менша за суму довжин двох інших його сторін.
- III. Довжина сторони будь-якого квадрата вдвічі менша за його периметр.

| A      | Б             | В            | Г              | Д            |
|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| лише I | лише I та III | лише I та II | лише II та III | I, II та III |

11. Розв'яжіть систему рівнянь  $\begin{cases} 10x - 4y = 26, \\ 6x + 4y = 6. \end{cases}$  Для одержаного розв'язку  $(x_0; y_0)$  обчисліть добуток  $x_0 \cdot y_0$ .

| A  | Б  | В | Г | Д |
|----|----|---|---|---|
| -3 | -6 | 4 | 6 | 3 |

12. Укажіть похідну функції  $f(x) = 4x^3 + \operatorname{tg} x$ .

А  $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

Б  $f'(x) = 12x - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

В  $f'(x) = x^4 + \frac{1}{\cos^2 x}$

Г  $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$

Д  $f'(x) = x^4 - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

13. Розв'яжіть нерівність  $10^{x+1} > 0,01$ .


| А               | Б               | В               | Г               | Д              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| $(-\infty; -3)$ | $(-\infty; -2)$ | $(-3; +\infty)$ | $(-2; +\infty)$ | $(1; +\infty)$ |

14. Обчисліть  $\cos 210^\circ$ .


| А             | Б              | В                    | Г                     | Д                     |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ |

15. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює  $24\pi$ , а довжина кола його основи –  $4\pi$ . Визначте висоту цього циліндра.


| A | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |



16. На рисунку зображено поверхню повітряного змія, що складається з двох рівних прямокутних трикутників  $AMB$  й  $CNB$  та ромба  $ABCD$ . Точки  $A$  і  $C$  належать відрізкам  $DM$  і  $DN$  відповідно. Гострий кут ромба дорівнює  $60^\circ$ ,  $BD = 2$  м. Визначте площину поверхні (четирикутника  $MBND$ ) цього змія, якщо всі його елементи лежать в одній площині. Виберіть відповідь, найближчу до точної.



| A                 | Б                 | В                 | Г                 | Д                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $1,5 \text{ м}^2$ | $1,7 \text{ м}^2$ | $2,6 \text{ м}^2$ | $3,4 \text{ м}^2$ | $3,9 \text{ м}^2$ |



У завданнях 17–20 до кожного з трьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!


Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей


17. На рисунках (1–3) зображені графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку  $[-3; 3]$ . Установіть відповідність між графіком (1–3) функції та властивістю (А – Д) цієї функції.

*Графік функції*


1



2



3



*Властивість функції*

- А графік функції двічі перетинає графік функції  $y = 2^x$
- Б графік функції є фрагментом графіка функції  $y = 1 - x$
- В графік функції є фрагментом графіка функції  $y = 1 + x$
- Г функція є непарною
- Д функція зростає на проміжку  $[0; 3]$

|   | А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |

18. Установіть відповідність між виразом (1–3) та твердженням про його значення (А – Д), яке є правильним, якщо  $a = -0,6$ .

*Вираз*

- 1  $a^2$
- 2  $|a|$
- 3  $\log_2(4 + a)$

**А Б В Г Д**


|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*Твердження про значення виразу*

- А** дорівнює дробу  $\frac{3}{5}$   
**Б** є від'ємним не цілим числом  
**В** належить проміжку  $[0; 0,5]$   
**Г** є цілим числом  
**Д** більше за 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

19. У прямокутник  $ABCD$  вписано рівнобедрений трикутник  $AKD$  так, як показано на рисунку.  $AD = 12$  см,  $AK = 10$  см. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



*Початок речення*

- 1 Довжина сторони  $AB$  дорівнює
- 2 Радіус кола, описаного навколо прямокутника  $ABCD$ , дорівнює
- 3 Довжина середньої лінії трапеції  $ABKD$  дорівнює

**А Б В Г Д**


|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*Закінчення речення*

- А**  $2\sqrt{13}$  см.  
**Б** 8 см.  
**В** 9 см.  
**Г**  $4\sqrt{13}$  см.  
**Д** 4 см.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

20. На рисунку зображене прямокутний паралелепіпед  $ABCDA_1B_1C_1D_1$ . До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



*Початок речення*

- 1 Пряма  $BD$
- 2 Пряма  $A_1C_1$
- 3 Площина  $ABC_1$

**А Б В Г Д**

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> |


*Закінчення речення*

- А** паралельна площині  $ABC$ .
- Б** належить площині  $ABC$ .
- В** перпендикулярна до площини  $ABC$ .
- Г** паралельна прямій  $CD$ .
- Д** перпендикулярна до прямої  $CD$ .

Розв'яжіть завдання 21–26. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у бланку А.


21. За 800 г борошна фабрики «Колос» заплатили 16 грн 56 коп., а за 1 кг борошна фабрики «Хлібна» – 18 грн.

1. Скільки гривень коштує 1 кг борошна фабрики «Колос»?




Відповідь:    ,

2. На скільки відсотків 1 кг борошна фабрики «Колос» дорожчий за 1 кг борошна фабрики «Хлібна»?



Відповідь:    ,

22. На колі із центром у точці  $O$  вибрано точки  $A$ ,  $B$  й  $C$  так, що  $\angle ACB = 15^\circ$  (див. рисунок). Довжина меншої дуги  $AB$  кола дорівнює  $8\pi$  см.



1. Визначте градусну міру центрального кута  $AOB$ , що спирається на меншу дугу  $AB$ .


Відповідь:    ,

2. Визначте радіус цього кола (у см).

Відповідь:    ,


23. У прямокутній системі координат у просторі задано точки  $A(-7; 4; -3)$  і  $B(17; -4; 3)$ . Точка  $C$  є серединою відрізка  $AB$ .

1. Визначте абсцису точки  $C$ .



Відповідь:    ,

2. Обчисліть довжину (модуль) вектора  $\vec{AC}$ .



Відповідь:    ,

**24.** В арифметичній прогресії  $(a_n)$  відомо, що  $a_2 = 1$ ,  $a_4 = 9$ .

**1.** Визначте різницю цієї прогресії.

Відповідь:    ,

**2.** Обчисліть суму  $S_{20}$  двадцяти перших членів цієї прогресії.

Відповідь:     ,

25. У шухляді лежать лише олівці та ручки. Відомо, що олівців на 12 менше, ніж ручок. Скільки олівців лежить у шухляді, якщо ймовірність вибрати навмання із шухляди одну ручку дорівнює  $\frac{5}{8}$ ?

Відповідь:    ,

26. Велосипедист витратив 2 години на дорогу з міста  $A$  до міста  $B$ . Мотоцикліст виїхав з міста  $A$  на півтори години пізніше за велосипедиста, але прибув у місто  $B$  одночасно з велосипедистом. Визначте відстань (у км) між містами  $A$  та  $B$ , якщо швидкість мотоцикліста на 48 км/год більша за швидкість велосипедиста. Уважайте, що велосипедист та мотоцикліст рухалися з міста  $A$  до міста  $B$  тією самою дорогою зі сталими швидкостями та без зупинок.

Відповідь:     ,


**Розв'яжіть завдання 27, 28.** Запишіть у бланку *Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

**27.** Задано функцію  $y = \sqrt{x} - 2$ .

- Для наведених у таблиці значень  $x$  та у заданої функції визначте відповідні їм значення  $y$  та  $x$ . Результати запишіть у таблицю.

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 0   |     |
|     | 0   |
| 9   |     |


- Побудуйте графік функції  $y = \sqrt{x} - 2$ .
- Позначте на рисунку точки перетину графіка функції з осями координат та укажіть координати цих точок.
- Знайдіть одну з первісних  $F(x)$  для функції  $f(x) = \sqrt{x} - 2$ .
- Запишіть формулу для обчислення площини  $S$  фігури, обмеженої графіком функції  $f$  та осями координат.
- Обчисліть площину  $S$  цієї фігури.



Відповідь:

28. У правильній чотирикутній піраміді  $SABCD$  з основою  $ABCD$  бічне ребро утворює з площею основи кут  $\beta$ . Довжина бічного ребра дорівнює 12.

1. Зобразіть на рисунку правильну чотирикутну піраміду  $SABCD$  та позначте кут  $\beta$  між бічним ребром  $SA$  та площею основи піраміди.
2. Визначте довжину висоти піраміди.
3. Знайдіть об'єм піраміди  $SABCD$ .



Відповідь:

## Похідна функції

$C, a$  – сталі

$$(C)' = 0$$

$$x' = 1 \quad (x^a)' = ax^{a-1}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x \quad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(u + v)' = u' + v' \quad (u - v)' = u' - v'$$

$$(uv)' = u'v + uv' \quad (Cu)' = Cu'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

## Первісна функції та визначений інтеграл

| Функція $f(x)$       | Загальний вигляд первісних $F(x) + C$ , $C$ – довільна стала |
|----------------------|--|
| 0                    | $C$  |
| 1                    | $x + C$  |
| $x^a, a \neq -1$     | $\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$                                    |
| $\frac{1}{x}$        | $\ln  x  + C$  |
| $e^x$                | $e^x + C$  |
| $\sin x$             | $-\cos x + C$  |
| $\cos x$             | $\sin x + C$   |
| $\frac{1}{\cos^2 x}$ | $\operatorname{tg} x + C$                                    |

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \text{ – формула Ньютона-Лейбніца}$$

## Тригонометрія

$$\sin \alpha = y_a \quad \cos \alpha = x_a \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$


$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha \quad \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} \quad \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$




## Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

| $\alpha$                   | рад  | 0         | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$       | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$      |
|----------------------------|------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|                            | град | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      | $180^\circ$ | $270^\circ$      | $360^\circ$ |
| $\sin \alpha$              |      | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0           | -1               | 0           |
| $\cos \alpha$              |      | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1          | 0                | 1           |
| $\operatorname{tg} \alpha$ |      | 0         | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | не існує        | 0           | не існує         | 0           |

## ГЕОМЕТРІЯ

### Трикутники

#### Довільний трикутник



$$p = \frac{a+b+c}{2} \quad a + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$


$R$  – радіус кола, описаного навколо трикутника  $ABC$

$$S = \frac{1}{2}a \cdot h_a \quad S = \frac{1}{2}b \cdot c \cdot \sin \alpha \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

#### Прямокутний трикутник


$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (теорема Піфагора)}$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha \quad \frac{a}{c} = \sin \alpha \quad \frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha$$



### Чотирикутники


#### Паралелограм



$$S = ab \sin \gamma$$


$$S = ah_a$$

#### Прямокутник



$$S = ab$$


#### Ромб



$$S = \frac{1}{2}d_1d_2,$$

$d_1, d_2$  – діагоналі ромба


#### Трапеція



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h,$$

$a$  і  $b$  – основи трапеції


### Коло



$$L = 2\pi R$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$


### Круг



$$S = \pi R^2$$

### Об'ємні фігури та тіла


#### Пряма призма



$$V = S_{\text{очн}} \cdot H$$

$$S_6 = P_{\text{очн}} \cdot H$$


#### Правильна піраміда



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{очн}} \cdot H$$

$$S_6 = \frac{1}{2} P_{\text{очн}} \cdot m$$


#### Циліндр



$$V = \pi R^2 H$$

$$S_6 = 2\pi R H$$


#### Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

$$S_6 = \pi R L$$

#### Куля, сфера



$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$S = 4\pi R^2$$

### Координати та вектори

$$A(x_1, y_1, z_1) \quad M(x_0, y_0, z_0) \quad B(x_2, y_2, z_2)$$

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad z_0 = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

$$\overrightarrow{AB}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \quad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$\vec{a}(a_1, a_2, a_3) \quad \vec{b}(b_1, b_2, b_3)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi$$

Кінець зошита